



PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 01.632.094/0001-84
Coord. Mun. de Vigilância Epidemiológica



NOTA INFORMATIVA

ASSUNTO: CASO CONFIRMADO DE MENINGITE MENINGOCÓCICA E ORIENTAÇÕES

A **Meningite Meningocócica** é uma síndrome infecciosa causada pela bactéria *Neisseria meningitidis* que pode provocar um quadro de irritação meníngea caracterizada por hipertermia, anorexia, apatia, vômitos em jato, rigidez de nuca, sonolência e convulsão. Podem estar presentes: fotofobia, petéquias, diarreia e mialgia.

O homem é o **único reservatório** e sua transmissão é direta de pessoa a pessoa, por meio das vias respiratórias, por gotículas e secreções da nasofaringe, **HAVENDO NECESSIDADE DE CONTATO ÍNTIMO E PROLONGADO** com o indivíduo portador ou doente. (Residentes da mesma casa, dormitório coletivo ou alojamento).

O período de incubação é curto, de 2 a 10 dias, em média de 3 a 4 dias. A transmissibilidade persiste até que o meningococo desapareça da nasofaringe do indivíduo doente. Geralmente ocorre nas primeiras 24h após o uso da antibioticoterapia específica.

A quimioprofilaxia constitui medida eficaz na prevenção de casos secundários. **Está indicado, somente, para os contatos íntimos de casos meningocócica.** O fármaco de escolha para a quimioprofilaxia é a Rifampicina 600mg/dose, que deve ser administrada a todos **CONTATOS ÍNTIMOS**, no prazo de 48h da exposição à fonte de infecção, admitindo-se prazo máximo de 7 dias. (Quadro 01).

Ressaltamos que o uso da quimioprofilaxia, muito embora não assegure efeito protetor absoluto e prolongado, tem sido adotada como eficaz medida de prevenção de casos secundários.

NÃO HÁ INDICATIVO DE VACINAÇÃO PÓS EXPOSIÇÃO.

A **Precaução por gotículas** com utilização de EPI **máscara cirúrgica** está indicado ao **PACIENTE** nas primeiras 24h após o início da antibioticoterapia, bem como a Precaução Padrão.

Em caso de **SUSPEITA**; o indivíduo apresentando: febre, "dor de cabeça forte", rigidez no pescoço, vômitos em jato, convulsão e/ou manchas vermelhas pelo corpo deverá procurar a Unidade Hospitalar mais próxima para ser iniciada a instituição terapêutica específica.

Medidas preventivas a serem adotadas:

- a) Higienização das mãos com água e sabão ou álcool-gel ao tossir ou contato com superfícies contaminadas;
- b) Evitar o uso de objetos compartilhados (copos, garrafinhas de água, talheres não higienizados, canudos, etc.);
- c) Ao utilizar bebedouros, utilizar copos. Nunca beber água diretamente da torneira.


Quadro 01: Esquemas de profilaxias recomendados

Agente etiológico	Doses	Intervalos	Duração
<i>Neisseria meningitidis</i>	Rifampicina – 600mg/dose ou	12/12h	2 dias
	Ceftriaxone – 250mg IM dose única ou	Dose única	
	Ciprofloxacino 500mg VO	Dose única	

Salientamos que todas as informações constantes nesta Nota Informativa foram retiradas do Guia de Bolso de Doenças infecciosas e parasitárias da Secretaria de Vigilância em Saúde, Ministério da Saúde.

Certo do pronto atendimento; colocamo-nos à disposição para demais esclarecimentos, desde já agradeço e reitero votos de estima e apreço.

Cordialmente,



Robsoncley de Souza Coêlho Viana
Coordenador de Vigilância Epidemiológica de Picos